




**Možnosti stanovení
jednotlivých fenofází broskvoní
na základě meteorologických
údajů a jejich využití při
prognóze termínu sklizně**


Tomáš Litschmann

Příspěvek byl vytvořen s pomocí projektu NAZV QF3207


Nástup fenofáze plný květ u broskvoni odr. Redhaven



Datum nástupu plné sklizně broskví odrůdy Redhaven




Závislost mezi termínem kvetení a sklizně - Redhaven 1969-1998







Počátek kvetení odrůdy Frederika - Catharina




Datum zahájení sklizně odrůdy Frederika - Catharina



Vývoj SAT7 v jednotlivých letech



Velikost sumy hodinových AT7 od 1.1. do počátku kvetení






**Využití při signalizaci ošetření proti
kadeřavosti broskvoní**

30.06.2004 16:32


Průběh SAT v Mor. Žižkově nad 7 °C v jednotlivých letech




Sklizeň broskví – radostná událost pro každého ovocnáře




Velikost SAT7 do začátku sklizně




Vztah mezi SAT7 měsíc po kvetení a počtem dnů od počátku kvetení do sklizně



Vztah mezi SAT7 dva měsíce po kvetení a počtem dnů od počátku kvetení do sklizně





Děkuji za pozornost

